

Portrait régional de la santé des aîné.es francophones et anglophones de l'Ontario

Résultats de l'Enquête sur la
santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC), cycles
combinés 2015-2020

Louise Bouchard, Ricardo Batista, Patrick Duong

Université d'Ottawa

2024



REMERCIEMENTS

Cette recherche a été rendue possible grâce à l'appui financier des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre du projet *Population âgée francophone de l'Ontario: conditions de vie, états de santé et expériences de soins en contexte minoritaire* (subvention no 178125, 2021-2025) et du projet *Évaluation de la performance des systèmes de santé à l'égard des communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) : offre, demande et équité d'accès* (subvention d'équipe 2024-2030).

Les analyses contenues dans ce texte ont été réalisées au CDRO, membre du Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR). Les services et activités du CDRO sont rendues possibles grâce à l'appui financier du CRSH, des IRSC, de la FCI, de Statistique Canada, l'Université d'Ottawa et l'Université du Québec en Outaouais. Les idées exprimées dans ce texte n'engagent que ses auteurs.

CITATION SUGGÉRÉE

Bouchard, L., Batista, R., Duong, P. (2024) *La santé de la population francophone et anglophone de l'Ontario âgée de 65 ans et plus : portrait régional tiré de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2015-2020*. Rapport de recherche, Université d'Ottawa

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	4
Méthodologie	4
Analyses statistiques	5
Liste des indicateurs	7
SOMMAIRE DES RÉSULTATS (Tableaux détaillés en annexe)	9
PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET DÉTERMINANTS SOCIAUX	9
COMPORTEMENTS ET HABITUDES DE VIE	11
ÉTAT DE SANTÉ ET LIMITATIONS	12
UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ	13
Synthèse des principaux constats	16
Annexe 1 : Tableaux détaillés	17

INTRODUCTION

Ce rapport vise à dresser un portrait de santé de la population ontarienne âgée de 65 ans et plus selon le groupe de langue officielle et les sous-régions de la province — l'Est, le Nord et le Sud-Ouest — à partir des données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de Statistique Canada. Il présente le profil sociodémographique des personnes aînées, leurs comportements et habitudes de vie, leurs problèmes de santé et limitations d'activités, ainsi que certains indicateurs relatifs à l'utilisation des services de santé.

MÉTHODOLOGIE

Source de données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycles bisannuels combinés 2015-2016; 2017-2018 et 2019-2020.

L'ESCC vise la population âgée de 12 ans et plus résidant dans les dix provinces et les trois territoires du Canada. Sont exclus du champ de l'enquête les personnes vivant dans les réserves et autres établissements autochtones des provinces, les membres à temps plein des Forces armées canadiennes, les personnes vivant en établissement, les jeunes de 12 à 17 ans placés en famille d'accueil ainsi que les personnes résidant dans les régions sociosanitaires du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James au Québec. Ensemble, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus (Statistique Canada, 2018). Depuis 2007, les données de l'enquête sont recueillies annuellement auprès de 65 000 répondants. Auparavant, elles étaient recueillies aux deux ans auprès de 130 000 répondants. (Statistique Canada, 2023 : https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&Id=1263799)

Population à l'étude : Les groupes linguistiques ont été définis à partir de trois variables linguistiques disponibles dans l'ESCC : la langue maternelle, la connaissance des langues officielles et la langue le plus souvent parlée à la maison. Ces variables permettent de construire l'indicateur de la première langue officielle parlée (PLOP), utilisé comme variable de référence pour identifier les communautés de langue officielle en situation minoritaire. L'algorithme de la PLOP permet ainsi de distinguer les populations francophone, anglophone et bilingue.

Régions : Les résultats sont présentés pour l'ensemble de l'Ontario et pour trois grandes régions, regroupées afin d'assurer une taille d'échantillon suffisante pour les analyses : le Sud-Ouest, le Nord et l'Est. La région du Sud-Ouest regroupe l'Ouest de la province (anciens RLISS 1 à 4), la région centrale (RLISS 5, 6, 8 et 12) ainsi que Toronto (RLISS 7). La région de l'Est comprend les RLISS 9, 10 et 11, tandis que la région du Nord regroupe le Nord-Est (RLISS 13) et le Nord-Ouest (RLISS 14).

Taille de l'échantillon : La présente analyse se fonde sur un échantillon de 29 066 personnes âgées de 65 ans et plus (27 289 anglophones et 1 777 francophones).

		Population totale		Population âgée (65+)	
Région	Groupe linguistique	Population pondérée	Échantillon	Population pondérée	Échantillon
ONTARIO	Anglophone	33 900 226	89 619	6 188 066	27 289
	Francophone	1 500 202	5 232	328 782	1 777
	Total	35 400 428	94 851	6 516 848	29 066
SUD-OUEST	Anglophone	24 190 379	55 998	4 285 171	16 290
	Francophone	476 155	1 082	91 115	347
	Total	24 666 534	57 080	4 376 286	16 637
EST	Anglophone	8 084 383	22 299	1 537 628	7 335
	Francophone	732 512	2 048	160 367	679
	Total	8 816 895	24 347	1 697 995	8 014
NORD	Anglophone	1 625 463	11 322	365 267	3 664
	Francophone	291 536	2 102	77 301	751
	Total	1 916 999	13 424	442 568	4 415

ANALYSES STATISTIQUES

Les résultats présentés dans ce rapport correspondent à des proportions brutes accompagnées de leurs intervalles de confiance (IC) à 95 %, calculés à l'aide de la méthode de rééchantillonnage *bootstrap*, afin de tenir compte de la sous-estimation des erreurs types associée au plan de sondage complexe de l'ESCC (Rust et Rao, 1996).

La comparaison des indicateurs de santé entre les populations francophone et anglophone repose sur deux approches complémentaires : l'examen des intervalles de confiance à 95 % et l'estimation du ratio des proportions (francophones/anglophones). Pour un intervalle de confiance à 95 %, on considère que, dans 95 % des échantillons possibles, l'intervalle contiendrait la valeur réelle du paramètre estimé. L'absence de chevauchement entre deux intervalles de confiance suggère une différence statistiquement significative au seuil de 0,05. Toutefois, la présence d'un chevauchement ne permet pas de conclure automatiquement à l'absence de différence significative.

Le ratio des proportions est obtenu en divisant la proportion observée chez les francophones par celle observée chez les anglophones. Un ratio supérieur à 1 indique une situation relativement moins favorable chez les francophones, alors qu'un ratio inférieur à 1 indique une situation moins favorable chez les anglophones. Aux fins de l'interprétation, un écart a été considéré comme important lorsque le ratio était supérieur ou égal à 1,2 ou inférieur ou égal à 0,8, soit une différence relative d'au moins 20 % entre les deux groupes.

Comme les estimations de l'ESCC reposent sur des données d'échantillonnage, elles comportent une variabilité liée au fait qu'un échantillon différent pourrait produire des résultats différents. La qualité des estimations a été évaluée à l'aide du coefficient de variation (CV), qui mesure l'erreur d'échantillonnage relative à l'estimation. L'examen des intervalles de confiance fournit également une indication de la précision des estimations : des intervalles larges traduisent une plus grande variabilité et une précision moindre, tandis que des intervalles plus étroits indiquent une meilleure précision.

Conformément aux règles de diffusion de Statistique Canada, les estimations présentant un coefficient de variation supérieur à 33 % sont jugées non fiables. Ces estimations ne devraient pas être diffusées ou doivent être interprétées avec prudence. Dans le présent rapport, elles seront signalées lorsqu'elles seront présentées.

Symboles

^E Estimation à utiliser avec prudence ($16,6 \% < \text{c.v.} \leq 33,3\%$)

^F Estimation pas assez fiable pour publication ($\text{c.v.} > 33,3\%$)

^x Données confidentielles en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

Les analyses ont été exécutées à l'aide du logiciel R (version 4.2.2)

Références :

Rust, K. and Rao, J. (1996). Variance estimation for complex surveys using replication techniques. *Statistical Methods in Medical Research*, 5(3), 283-310.

LISTE DES INDICATEURS

Profil sociodémographique et déterminants sociaux de la santé

Âge	• 65-74 ans • 75 ans et plus
Sexe	• Homme • Femme
Langue parlée	• Français • Anglais • Bilingue
Situation de logement ou de famille	• Vit seul • Vit avec d'autres, autre situation
Scolarité	• Sans diplôme d'études secondaires • Diplôme d'études secondaires • Diplôme d'études collégiales • Diplôme universitaire
Revenu	• Quintile du revenu total du ménage, par province (1 le plus faible, 5 le plus élevé)
Emploi (au cours de la dernière semaine)	• Oui • Non
Milieu de vie	• Urbain • Rural
Statut d'immigrant	• Oui • Non
Sentiment d'appartenance à la communauté	• Fort • Faible

Comportements et habitudes de vie

Activité physique de loisirs	• Inactif • Modérément actif • Actif
Tabagisme	• Non-fumeur • Ancien fumeur • Fumeur occasionnel • Fumeur régulier
Consommation d'alcool	• Non-buveur • Buveur occasionnel • Buveur régulier
Consommation excessive d'alcool	• Jamais • Occasionnelle • Souvent

État de santé

Santé générale perçue	• Mauvaise/très mauvaise • Bonne • Très bonne/excellente
Santé mentale perçue	• Mauvaise/très mauvaise • Bonne • Très bonne/excellente
Stress perçu	• Pas du tout/pas tellement • Un peu • Assez/extrêmement

Problèmes de santé et limitations

Surplus de poids	• Embonpoint • Obésité
Maladies chroniques	• Aucune • Une • Une et plus • Deux et plus • Nombre moyen de maladies chroniques
Limitation des activités en raison de douleurs ressenties	• Aucune limitation • Limitation légère • Limitation importante
Santé dentaire (port de prothèses dentaires)	• Oui • Non

Utilisation des services de santé

A un fournisseur habituel de soins	• Oui • Non
Langue de communication avec le fournisseur habituel de soins	• Anglais • Français
Dernière consultation avec un professionnel de la santé	• Moins de 3 mois • Entre 3 et 12 mois • Plus de 12 mois
Professionnel de la santé mentale consulté (12 derniers mois)	• Oui
Visite chez un professionnel des soins dentaires	• Une fois par an • Moins d'une fois par an ou en urgence • Jamais
Soins à domicile reçus (12 derniers mois)	• Oui
Type de soins reçus à domicile (12 derniers mois)	• Soins infirmiers • Soins personnels / aide-ménagère
Besoins de santé non comblés (12 derniers mois)	• Oui
Vaccin contre la grippe saisonnière (dernière fois)	• Moins d'un an • Moins de 2 ans • 2 ans et plus

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (Tableaux détaillés en annexe)

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET DÉTERMINANTS SOCIAUX

■ Âge

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Groupe d'âge	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
65- 75 ans	60,8 (59,7-61,8)	59,6 (56,1-63)	60,8 (59,5-62)	65,9 (58,4-73,4)	60,8 (58,9-62,7)	56,1 (50,8-61,4)	60,7 (58,4-63,1)	59,2 (54,9-63,5)
75 et plus	39,2 (38,2-40,3)	40,4 (37-43,9)	39,2 (38-40,5)	34,1 (26,6-41,6)	39,2 (37,3-41,1)	43,9 (38,6-49,2)	39,3 (36,9-41,6)	40,8 (36,5-45,1)

La proportion de francophones âgés de 75 ans et plus est légèrement plus élevée que celle des anglophones, particulièrement dans la région de l'Est. Cette différence ne s'observe toutefois pas dans le Sud-Ouest.

■ Sexe

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Sexe	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Femmes	53,5 (52,5-54,4)	56,6 (53-60,2)	53,6 (52,4-54,8)	56,6 (48,8-64,4)	53,4 (51,6-55,1)	57,7 (52-63,4)	52,7 (50,6-54,7)	54,2 (49,5-58,9)
Hommes	46,5 (45,6-47,5)	43,4 (39,8-47)	46,4 (45,2-47,6)	43,4 (35,6-51,2)	46,6 (44,9-48,4)	42,3 (36,6-48)	47,3 (45,3-49,4)	45,8 (41,1-50,5)

Les femmes représentent une proportion légèrement plus élevée chez les aînés francophones que chez les anglophones.

■ Bilinguisme anglais-français

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Bilingue	0,4 (0,3-0,6)	9,0 (6,7-11,4)	0,2 (0,1-0,3) ^É	8,7 (5,1-12,3) ^É	0,8 (0,5-1,2)	9,9 (5,6-14,2) ^É	1,6 (1,1-2,1)	7,5 (4,5-10,6) ^É

Caractère gras : statistiquement significatif ^É à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

La proportion d'aînés bilingues est beaucoup plus élevée chez les francophones que chez les anglophones. Les estimations pour le Nord doivent toutefois être interprétées avec prudence.

■ Situation de logement ou de famille

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Situation	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Vivant seul	25,7 (24,3-27,1)	29,4 (23,3-35,5)	25,6 (24,2-27,0)	30,0 (23,9-36,1)	25,3 (23,9-26,7)	28,4 (21,9-34,9)	28,5 (28,0-29,0)	30,7 (26,2-35,3)

Les aînés francophones sont légèrement plus nombreux à vivre seuls que les anglophones

▪ Scolarité

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Diplôme	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Sans diplôme	19,3 (18,5-20,0)	30,0 (26,9-33,1)	19,5 (18,6-20,5)	19,6 (13,8-25,4)	17,0 (15,5-18,4)	26,1 (21,7-30,6)	26,0 (24,1-27,9)	50,3 (45,7-54,9)
Diplôme universitaire	28,8 (27,9-29,8)	23,5 (19,7-27,4)	29,7 (28,6-30,9)	26,7 (19,2-34,3)	28,7 (26,8-30,5)	28,1 (21,7-34,6)	19,4 (17,8-21,1)	10,3 (7,2-13,3)

Caractère gras : statistiquement significatif

La proportion d'aînés sans diplôme est plus élevée chez les francophones, particulièrement dans le Nord. Cette différence ne s'observe toutefois pas dans le Sud-Ouest.

▪ Revenu

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Quintile	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Le plus pauvre (Q1)	19,6 (18,8-20,5)	20,3 (17,4-23,3)	20,4 (19,3-21,6)	21,3 (14,8-27,8)	17,9 (16,3-19,6)	18,1 (13,7-22,5)	17,6 (15,8-19,5)	23,9 (19,5-28,3)
Le plus riche (Q5)	16,3 (15,6-17,1)	13,0 (10,6-15,4)	16,3 (15,4-17,2)	14,4 (9,2-19,7) ^E	17 (15,5-18,4)	13,7 (10,2-17,2)	13,9 (12,2-15,5)	9,8 (6,7-13)

Caractère gras : statistiquement significatif

Les aînés francophones présentent globalement un profil socioéconomique moins favorable, avec une représentation plus importante dans le quintile de revenu le plus faible, particulièrement dans le Nord.

▪ Milieu de vie

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Milieu	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Urbain	82,9 (82,0-83,7)	78,4 (75,4-81,4)	86,6 (85,7-87,5)	90,6 (85,8-95,4)	75,9 (74,0-77,7)	77,7 (73,6-81,9)	68,4 (65,7-71,2)	65,4 (59,4-71,4)
Rural	17,1 (16,3-18)	21,6 (18,6-24,6)	13,4 (12,5-14,3)	9,4 (4,6-14,2)	24,1 (22,3-26)	22,3 (18,1-26,4)	31,6 (28,8-34,3)	34,6 (28,6-40,6)

Caractère gras : statistiquement significatif

Les aînés francophones vivent plus souvent en milieu rural que les anglophones.

▪ Statut d'immigrant

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Immigrant	40,2 (39,2-41,1)	11,7 (8,8-14,6)	44,3 (43-45,6)	23,1 (16,3-29,9)	34,2 (32,3-36)	9,8 (5,4-14,2) ^E	17,0 (15,4-18,6)	2,4 (1,4-3,3) ^E

Caractère gras : statistiquement significatif

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

La proportion d'aînés ayant un statut d'immigrant est plus faible chez les francophones que chez les anglophones.

▪ Sentiment d'appartenance à la communauté locale

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Appartenance	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Faible	21,2 (20,4-22,0)	25,7 (22,7-28,8)	21,7 (20,6-22,8)	20,7 (14,6-26,9)	20,4 (18,9-22,0)	30,4 (25,3-35,4)	18,6 (16,8-20,4)	22,4 (18,4-26,4)

Caractère gras : statistiquement significatif

Les aînés francophones déclarent plus souvent un faible sentiment d'appartenance à leur communauté que les anglophones.

COMPOTEMENTS ET HABITUDES DE VIE

▪ Niveau d'activité physique de loisirs

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Activité	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Inactif	23,6 (22,8-24,4)	28,1 (24,7-31,6)	24,1 (23,1-25,1)	26,0 (20,2-31,8)	22,1 (20,6-23,6)	27,9 (22,7-33,2)	23,6 (22,0-25,3)	31,0 (26,6-35,3)

Caractère gras : statistiquement significatif

Les aînés francophones sont proportionnellement plus nombreux à être inactifs que les anglophones. Cette différence est statistiquement significative dans la région du Nord.

▪ Tabagisme

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Tabac	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Fumeur régulier/occasionnel	20,3 (19,5-21,1)	21,1 (18,0-24,2)	20,3 (19,3-21,3)	22,5 (16,3-28,8)	19,5 (18,0-21,1)	21,2 (16,6-25,8)	22,6 (20,7-24,4)	19,4 (15,5-23,3)

Caractère gras : statistiquement significatif

Environ un aîné sur cinq est fumeur. Les proportions sont généralement comparables entre les groupes linguistiques, bien que les francophones semblent légèrement plus nombreux à fumer, sauf dans le Nord où la proportion est plus faible.

▪ Consommation d'alcool

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Alcool	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Buveur régulier	52,5 (51,5-53,6)	53,5 (49,3-57,6)	52,1 (50,8-53,4)	52,2 (44,3-60,2)	53,3 (51,4-55,1)	57,7 (51,1-64,2)	54,7 (52,4-57,1)	46,4 (41,9-50,8)
Consommation excessive*	7,2 (6,7-7,6)	5,8 (4,2-7,5)	6,8 (6,2-7,4)	6,5 (3,5-9,5) ^E	7,6 (6,7-8,4)	4,6 (2,2-7,0) ^E	9,9 (8,7-11,0)	7,7 (4,1-11,4) ^E

* A bu 5+ / 4+ verres même occasion – fréquence, 12 mois : Une fois par mois ou plus

Caractère gras : statistiquement significatif ^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

Plus de la moitié des aînés déclarent consommer régulièrement de l'alcool. Les francophones du Nord sont significativement moins nombreux que les anglophones à rapporter une consommation régulière. Les estimations suggèrent également une proportion plus faible de consommation excessive chez les francophones, mais plusieurs estimations doivent être interprétées avec prudence.

ÉTAT DE SANTÉ ET LIMITATIONS

▪ Santé perçue

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Mauvaise santé	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Santé générale	19,6 (18,8-20,4)	19,1 (16,5-21,8)	19,8 (18,9-20,8)	16,8 (11,1-22,5)	18,3 (16,9-19,7)	15,6 (11,7-19,5)	22,5 (20,7-24,3)	29,1 (25,1-33,1)
Santé mentale	5,6 (5,2-6,1)	5,9 (4-7,7)	5,9 (5,4-6,5)	5,5 (1,1-10,0)	4,9 (4,1-5,6)	4,6 (1,9-7,4)	5,4 (4,3-6,4)	8,7 (6,0-11,3)

Caractère gras : statistiquement significatif

Les aînés francophones du Nord sont significativement plus nombreux que les anglophones à déclarer un mauvais état de santé générale et mentale.

▪ Stress perçu

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Niveau de stress	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Élevé	12,5 (11,9-13,1)	12,6 (10,3-14,9)	13,0 (12,2-13,8)	14,5 (9,9-19,1)	11,3 (10,3-12,3)	11,6 (8,1-15,2)	11,4 (10,1-12,8)	12,5 (9,1-15,9)

Environ un aîné sur huit, tant chez les francophones que chez les anglophones, déclare un niveau élevé de stress au quotidien.

▪ Surplus de poids

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Embonpoint (IMC entre 25 et 30)	33,9 (33,0-34,9)	36,3 (32-40,5)	33,9 (32,7-35,1)	35,2 (26,5-44,0)	33,6 (31,7-35,5)	35,8 (28,9-42,6)	35,4 (33-37,7)	38,7 (33,9-43,5)
Obésité (IMC > 30)	29,7 (28,8-30,6)	31,4 (28,2-34,6)	29,7 (28,7-30,8)	28,1 (21,8-34,4)	28,6 (26,9-30,4)	32,8 (27,7-37,9)	34,1 (32,1-36,2)	32,5 (27,9-37)

Les aînés francophones semblent légèrement plus nombreux à présenter de l'embonpoint. Les différences observées pour l'obésité sont moins marquées.

▪ Maladies chroniques

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Multimorbidité	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Au moins une maladie	83,7 (83-84,4)	85,3 (82,6-88)	83,5 (82,5-84,4)	86,6 (81,3-91,9)	83,9 (82,6-85,2)	82,5 (77,8-87,2)	85,8 (84,3-87,3)	89,6 (86,6-92,6)
Au moins 2 maladies	60,0 (59,0-60,9)	59,2 (55,6-62,8)	59,5 (58,3-60,7)	54,6 (47,0-62,2)	60,8 (59,1-62,5)	57,7 (51,9-63,5)	62,0 (59,9-64,1)	67,8 (63,6-72,0)

Les aînés francophones sont légèrement plus nombreux à présenter au moins une maladie chronique. La multimorbidité est comparable entre les groupes à l'échelle de l'Ontario, mais semble plus fréquente chez les francophones du Nord.

▪ Limitations d'activité en raison de douleurs

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Aucune limitation	66,0 (64,5-67,6)	69,9 (64,3-75,4)	66,8 (64,9-68,7)	69,6 (59-80,3)	65,1 (62,0-68,2)	74,6 (65,9-83,4)	61,4 (57,7-65,1)	59,6 (52,6-66,6)
Limitations sévères	13,6 (12,5-14,7)	10,8 (6,8-14,8) ^E	13,3 (11,9-14,6)	14,4 (7,9-20,9) ^E	13,6 (11,6-15,6)	7,3 (0,8-13,7) ^F	17,4 (14,6-20,2)	14,4 (7,4-21,4) ^E

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%) ^F Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Les estimations suggèrent que les aînés francophones sont moins nombreux à présenter des limitations sévères liées à la douleur. Cette tendance doit toutefois être interprétée avec prudence.

▪ Santé dentaire

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Prothèse dentaire	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Port prothèse dentaire	40,9 (39,1-42,7)	59,7 (52,4-66,9)	39,6 (37,3-41,9)	55,6 (42,0-69,1)	42,6 (39,1-46,1)	62,7 (52,4-73,0)	48,4 (45,0-51,9)	59,0 (50,0-68,1)

Caractère gras : statistiquement significatif

Le port d'une prothèse dentaire est significativement plus fréquent chez les aînés francophones que chez les anglophones.

UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ

▪ Fournisseur de soins régulier

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Fournisseur de soins	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
N'a pas de fournisseur de soins	3,6 (3,3-4,0)	5,5 (3,2-7,8)	3,4 (3,0-3,8)	6,4 (1,5-11,3) ^F	3,6 (2,9-4,3)	5,2 (1,6-8,7) ^F	6,2 (4,9-7,6)	5,3 (2,8-7,7) ^E

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%) ^F Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Les aînés francophones semblent légèrement plus nombreux à ne pas avoir de fournisseur régulier de soins. Les estimations régionales doivent toutefois être interprétées avec prudence.

▪ Langue de communication avec le fournisseur de soins

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Langue parlée	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Le français	3,5 (3,1-3,9)	41,0 (37,1-44,9)	4,1 (3,6-4,7)	6,8 (2,8-10,7)	2,6 (1,8-3,3)	56,8 (50,4-63,1)	0,4 (0,2-0,7) ^E	47,7 (42,4-53,0)

Caractère gras : statistiquement significatif ^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

La possibilité de communiquer en français avec un fournisseur régulier de soins est beaucoup plus fréquente chez les aînés francophones de l'Est (57 %) et du Nord (48 %) que chez ceux du Sud-Ouest (7 %). À l'échelle de l'Ontario, seulement 4 % des aînés anglophones déclarent communiquer en français avec leur fournisseur régulier de soins.

▪ Dernière consultation avec un professionnel de la santé

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Dernière consultation	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Moins de 3 mois	63,7 (62,0-65,5)	60,6 (53,9-67,4)	63,5 (61,3-65,7)	59,8 (45,7-74,0)	65,4 (62,2-68,6)	58,1 (47,2-69,0)	59,8 (56,1-63,5)	65,9 (55,8-76,0)
Plus de 12 mois	10,0 (8,8-11,2)	10,9 (7,5-14,3)	10,0 (8,5-11,5)	9,9 (2,4-17,5) ^F	9,6 (7,1-12,1)	13,4 (7,8-19,0) ^E	11,2 (8,3-14,1)	7,3 (3,4-11,2)

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%) ^F Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Environ 10 % des aînés déclarent ne pas avoir consulté un professionnel de la santé depuis plus d'un an, tandis que plus de 60 % l'ont fait au cours des trois derniers mois. Les différences entre les groupes linguistiques sont faibles.

▪ Consultation en santé mentale (dernière année)

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Consultation en santé mentale	7,8 (7,1-8,4)	7,6 (5,6-9,5)	7,9 (7,1-8,8)	7,9 (3,5-12,2) ^E	7,3 (6,1-8,5)	7,5 (4,7-10,3) ^E	7,9 (6,4-9,3)	7,4 (4,1-10,7) ^E

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

Environ 8 % des aînés de la province, tant francophones qu'anglophones, déclarent avoir consulté un professionnel de la santé mentale au cours de la dernière année.

▪ Visite chez un professionnel de soins dentaires

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Visite chez le dentiste	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Jamais	5,9 (5,1-6,6)	11,5 (8,6-14,4)	5,6 (4,7-6,6)	9,6 (2,8-16,5) ^F	5,7 (4,4-7,1)	10,5 (7,2-13,7)	9,5 (7,5-11,6)	16,4 (10,3-22,4) ^E
Au moins une fois par an	73,5 (72,1-75,0)	63,0 (56,9-69,0)	74,0 (72,2-75,9)	64,2 (50,5-77,8)	74,2 (71,5-76,9)	66,7 (57,4-76,0)	65,0 (61,4-68,5)	53,4 (45,3-61,5)

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%) ^F Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Les aînés francophones sont plus nombreux que les anglophones à déclarer n'avoir jamais consulté un dentiste.

▪ Soins à domicile reçus (dernière année)

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Soins à domicile	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Soins à domicile reçus	13,3 (12,4-14,2)	12,9 (10,4-15,4)	12,7 (11,5-14,0)	13,4 (8,1-18,6)	13,9 (12,5-15,4)	13,0 (9,1-17)	17,5 (15,6-19,4)	12,2 (9,2-15,3)

Caractère gras : statistiquement significatif

Dans le Nord, les aînés francophones sont moins nombreux que les anglophones à déclarer avoir reçu des soins à domicile.

▪ Type de soins à domicile reçus

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Type de soins	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Soins infirmiers	5,4 (4,9-6,0)	6,1 (4,2-8,0)	5,0 (4,3-5,7)	5,6 (2,2-9,0) ^E	5,7 (4,7-6,8)	6,9 (3,6-10,2) ^E	9,2 (7,8-10,7)	5,0 (2,7-7,4)
Soins personnels / aide-ménagère	7,4 (6,6-8,1)	8,3 (6,2-10,5)	6,9 (5,9-8,0)	10,7 (5,8-15,7) ^E	8,1 (7,0-9,2)	7,3 (4,0-10,7) ^E	8,9 (7,4-10,4)	7,8 (5,7-9,8)

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

Dans le Nord, les aînés francophones semblent moins nombreux que les anglophones à avoir reçu des soins infirmiers à domicile.

▪ Besoins de santé non comblés (dernière année)

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Besoins de santé	4,2 (3,8-4,6)	2,7 (1,5-3,9)	4,1 (3,7-4,6)	1,7 (0,2-3,2) ^F	4,6 (3,9-5,3)	3,0 (0,9-5,2) ^F	3,1 (2,0-4,2) ^E	3,2 (1,6-4,8) ^E

Caractère gras : statistiquement significatif publication (CV supérieur à 33%).

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

^F Estimation pas assez fiable pour

À l'échelle de l'Ontario, les aînés francophones semblent moins nombreux que les anglophones à déclarer des besoins de santé non comblés. Les estimations régionales doivent toutefois être interprétées avec prudence.

▪ Vaccination contre la grippe

	ONTARIO		SUD-OUEST		EST		NORD	
Vaccin contre la grippe	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone	Anglophone	Francophone
Il y a plus de 2 ans	11,6 (10,9-12,3)	14,0 (11,0-17,0)	11,6 (10,7-a)	18,7 (10,6-26,8) ^E	11,4 (10,1-12,7)	12,5 (8,9-16,2)	12,9 (11,1-14,6)	11,7 (7,6-15,8) ^E

^E à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

Les aînés francophones semblent légèrement plus nombreux que les anglophones à déclarer ne pas avoir reçu le vaccin contre la grippe depuis plus de deux ans.

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX CONSTATS



Caractéristiques sociodémographiques

Dans l'ensemble, les aîné.es francophones de l'Ontario se distinguent des anglophones par un profil sociodémographique plus vulnérable. Les francophones sont légèrement plus âgés, comptent une plus forte proportion de personnes de 75 ans et plus ainsi qu'une présence plus importante de femmes. La proportion d'aîné.es vivant seul.es est légèrement plus élevée chez les francophones, qui résident également plus souvent en milieu rural. Leur situation socioéconomique apparaît également moins favorable, avec une proportion plus élevée de personnes sans diplôme et une surreprésentation dans les quintiles de revenu les plus faibles, particulièrement dans le Nord. Les aîné.es francophones sont également moins nombreux et nombreuses à avoir un statut d'immigrant, rapportent plus fréquemment un faible sentiment d'appartenance à leur communauté et présentent un niveau de bilinguisme anglais-français plus élevé.



Comportements et habitudes de vie

Les comportements et habitudes de vie des aîné.es francophones sont globalement comparables à ceux des anglophones, bien que certaines variations régionales soient observées. Les francophones tendent à être plus inactifs, surtout dans le Nord. Le tabagisme est généralement similaire entre les groupes linguistiques, bien qu'il semble légèrement plus fréquent chez les francophones, sauf dans le Nord. Enfin, plus de la moitié des aîné.es déclarent consommer régulièrement de l'alcool, mais les francophones du Nord sont moins nombreux à rapporter une consommation régulière. Les estimations suggèrent également une consommation excessive moins fréquente chez les francophones.



Perception de la santé, problèmes de santé et limitations

Les aîné.es francophones présentent certains indicateurs de santé moins favorables que les anglophones, particulièrement dans le Nord. Ils sont plus nombreux à déclarer un mauvais état de santé générale et mentale. Les francophones semblent également légèrement plus nombreux à présenter au moins une maladie chronique, tandis que la multimorbidité apparaît surtout plus fréquente dans le Nord. L'embonpoint est légèrement plus fréquent chez les francophones, tandis que les différences concernant l'obésité sont variables selon les régions. Les niveaux élevés de stress touchent environ une personne aînée sur huit, sans différence notable entre les groupes linguistiques. Enfin, les aîné.es francophones semblent moins nombreux à présenter des limitations sévères liées à la douleur, bien que cette tendance doive être interprétée avec prudence.



Utilisation des services de santé

L'utilisation des services de santé est généralement comparable entre les aîné.es francophones et anglophones. Les francophones semblent toutefois plus nombreux à ne pas avoir de fournisseur régulier de soins. L'accès à des services en français varie toutefois considérablement selon les régions : il est nettement plus élevé dans l'Est et le Nord, mais demeure très limité dans le Sud-Ouest. Les consultations auprès des professionnels de la santé et des services de santé mentale sont similaires entre les groupes.

Certaines différences sont néanmoins observées. Les aîné.es francophones sont plus nombreux et nombreuses à n'avoir jamais consulté un dentiste et semblent légèrement moins vacciné.e.s contre la grippe. Dans le Nord, les francophones paraissent également moins susceptibles d'avoir reçu des soins à domicile ou des soins infirmiers à domicile. Enfin, les besoins de santé non comblés semblent moins fréquents chez les francophones, mais les estimations régionales doivent être interprétées avec prudence.

ANNEXE 1 : TABLEAUX DÉTAILLÉS

Caractéristiques socio-démographiques

	Ontario			Sud-Ouest			Est			Nord		
	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (95%IC)	% (95%IC)	RC (95%IC)
Sexe												
Hommes	46,5 (45,6-47,5)	43,4 (39,8-47)	0,9 (0,9-1,0)	46,4 (45,2-47,6)	43,4 (35,6-51,2)	0,9 (0,8-1,1)	46,6 (44,9-48,4)	42,3 (36,6-48)	0,9 (0,8-1,0)	47,3 (45,3-49,4)	45,8 (41,1-50,5)	1,0 (0,9-1,0)
Femmes	53,5 (52,5-54,4)	56,6 (53-60,2)	1,1 (1,0-1,0)	53,6 (52,4-54,8)	56,6 (48,8-64,4)	1,1 (0,9-1,2)	53,4 (51,6-55,1)	57,7 (52-63,4)	1,1 (1,0-1,2)	52,7 (50,6-54,7)	54,2 (49,5-58,9)	1,0 (1,0-1,1)
Âge (65+)												
65 - 75 ans	60,8 (59,7-61,8)	59,6 (56,1-63)	1,0 (0,9-1,0)	60,8 (59,5-62)	65,9 (58,4-73,4)	1,1 (1,0-1,2)	60,8 (58,9-62,7)	56,1 (50,8-61,4)	0,9 (0,9-1,0)	60,7 (58,4-63,1)	59,2 (54,9-63,5)	1,0 (0,9-1,0)
75 et plus	39,2 (38,2-40,3)	40,4 (37-43,9)	1,0 (1,0-1,0)	39,2 (38-40,5)	34,1 (26,6-41,6)	0,9 (0,7-1,0)	39,2 (37,3-41,1)	43,9 (38,6-49,2)	1,1 (1,0-1,2)	39,3 (36,9-41,6)	40,8 (36,5-45,1)	1,0 (1,0-1,1)
1re langue officielle parlée (PLOP)												
Anglais	99,6 (99,4-99,7)			99,8 (99,7-99,9)			99,2 (98,8-99,5)			98,4 (97,9-98,9)		
Français		91,0 (88,6-93,3)			91,3 (87,7-94,9)			90,1 (85,8-94,4)			92,5 (89,4-95,5)	
Bilingue	0,4 (0,3-0,6)	9,0 (6,7-11,4)	22,5 (22,3-22,7)	0,2 (0,1-0,3) ^E	8,7 (5,1-12,3) ^E	43,5 (41,0-51,0)	0,8 (0,5-1,2)	9,9 (5,6-14,2) ^E	12,4 (11,2-12,8)	1,6 (1,1-2,1)	7,5 (4,5-10,6) ^E	4,7 (4,1-5,0)
Situation de logement / ménage												
Vivant seul	25,7 (24,3-27,1)	29,4 (23,3-35,5)	1,1 (1,0-1,3)	25,6 (24,2-27,0)	30,0 (23,9-36,1)	1,2 (1,0-1,3)	25,3 (23,9-26,7)	28,4 (21,9-34,9)	1,1 (0,9-1,3)	28,5 (28,0-29,0)	30,7 (26,2-35,3)	1,1 (0,9-1,2)
Vivant avec autres	67,0 (66,3-67,7)	64,5 (59,9- 69,0)	1,0 (0,9-1,0)	66,4 (65,7- 67,2)	64,7 (60,1-69,3)	1,0 (0,9-1,0)	68,4 (67,7-69,1)	64,3 (59,6-69,1)	0,9 (0,9-1,0)	67,4 (67,2-67,7)	64,4 (60,8-68,1)	1,0 (0,9-1,0)
Autre situation	7,3 (4,3-10,3)	6,2 (1,8-17,1) ^E	0,8 (0,4-1,7)	8,0 (4,8-11,1)	5,3 (0,1-22,0) ^F	0,7 (0,0-2,0)	6,3 (3,3-9,3)	7,3 (1,6-27,2) ^E	1,2 (0,5-2,9)	4,1 (3,3-4,8)	4,8 (0,3-15,7) ^E	1,2 (0,1-3,3)
Scolarité (diplôme)												
Sans diplôme	19,3 (18,5-20,0)	30,0 (26,9-33,1)	1,6 (1,5-1,7)	19,5 (18,6-20,5)	19,6 (13,8-25,4)	1,0 (0,7-1,2)	17,0 (15,5-18,4)	26,1 (21,7-30,6)	1,5 (1,4-1,7)	26,0 (24,1-27,9)	50,3 (45,7-54,9)	1,9 (1,9-2,0)
Études secondaires	23,8 (23,0-24,6)	18,8 (15,6-22,1)	0,8 (0,7-0,9)	23,5 (22,5-24,5)	20,6 (14,6-26,7)	0,9 (0,6-1,1)	24,6 (23,0-26,2)	18,4 (13,3-23,5)	0,7 (0,6-0,9)	23,8 (21,7-25,8)	17,6 (14,1-21,2)	0,7 (0,6-0,8)
Études post secondaires	28,1 (27,2-29,0)	27,6 (24,6-30,5)	1,0 (0,9-1,1)	27,3 (26,2-28,4)	33,0 (25,2-40,9)	1,2 (1,0-1,4)	29,8 (28,1-31,4)	27,3 (23,0-31,7)	0,9 (0,8-1,0)	30,8 (28,8-32,8)	21,8 (17,8-25,7)	0,7 (0,6-0,8)
Études universitaires	28,8 (27,9-29,8)	23,5 (19,7-27,4)	0,8 (0,7-0,9)	29,7 (28,6-30,9)	26,7 (19,2-34,3)	0,9 (0,7-1,1)	28,7 (26,8-30,5)	28,1 (21,7-34,6)	1 (0,8-1,1)	19,4 (17,8-21,1)	10,3 (7,2-13,3)	0,5 (0,4-0,6)

Revenu du ménage												
Quintile 1 (pauvre)	19,6 (18,8-20,5)	20,3 (17,4-23,3)	1,0 (0,9-1,1)	20,4 (19,3-21,6)	21,3 (14,8-27,8)	1,0 (0,8-1,3)	17,9 (16,3-19,6)	18,1 (13,7-22,5)	1 (0,8-1,1)	17,6 (15,8-19,5)	23,9 (19,5-28,3)	1,4 (1,2-1,5)
Quintile 2	24,3 (23,5-25,1)	27,5 (24,0-30,9)	1,1 (1,0-1,2)	24,3 (23,2-25,4)	26,5 (19,6-33,4)	1,1 (0,8-1,3)	23,9 (22,2-25,6)	26,8 (21,1-32,5)	1,1 (1,0-1,3)	25,4 (23,5-27,3)	29,9 (25,3-34,6)	1,2 (1,1-1,3)
Quintile 3	21,3 (20,4-22,1)	20,1 (17,0-23,2)	0,9 (0,8-1,0)	21,2 (20,1-22,3)	20,2 (14,5-26,0)	1,0 (0,7-1,2)	21,1 (19,6-22,7)	18,9 (14-23,7)	0,9 (0,7-1)	22,8 (20,7-24,9)	22,6 (18,4-26,7)	1,0 (0,9-1,1)
Quintile 4	18,5 (17,8-19,2)	19,1 (16,3-21,9)	1,0 (0,9-1,1)	17,8 (16,9-18,7)	17,6 (12,2-23,0)	1,0 (0,7-1,2)	20,0 (18,6-21,4)	22,6 (18,2-26,9)	1,1 (1-1,3)	20,3 (18,6-22,0)	13,7 (10,0-17,4)	0,7 (0,5-0,8)
Quintile 5 (riche)	16,3 (15,6-17,1)	13,0 (10,6-15,4)	0,8 (0,7-0,9)	16,3 (15,4-17,2)	14,4 (9,2-19,7) [£]	0,9 (0,6-1,1)	17 (15,5-18,4)	13,7 (10,2-17,2)	0,8 (0,7-0,9)	13,9 (12,2-15,5)	9,8 (6,7-13)	0,7 (0,5-0,8)
Milieu de vie												
Urbain	82,9 (82-83,7)	78,4 (75,4-81,4)	0,9 (0,9-1,0)	86,6 (85,7-87,5)	90,6 (85,8-95,4)	1,0 (1,0-1,1)	75,9 (74-77,7)	77,7 (73,6-81,9)	1 (1-1,1)	68,4 (65,7-71,2)	65,4 (59,4-71,4)	1,0 (0,9-1,0)
Rural	17,1 (16,3-18)	21,6 (18,6-24,6)	1,3 (1,1-1,4)	13,4 (12,5-14,3)	9,4 (4,6-14,2)	0,7 (0,4-1)	24,1 (22,3-26)	22,3 (18,1-26,4)	0,9 (0,8-1)	31,6 (28,8-34,3)	34,6 (28,6-40,6)	1,1 (1,0-1,2)
Statut d'immigrant												
N'est pas immigrant	59,8 (58,9-60,8)	88,3 (85,4-91,2)	1,5 (1,4-1,5)	55,7 (54,4-57)	76,9 (70,1-83,7)	1,4 (1,3-1,5)	65,8 (64-67,7)	90,2 (85,8-94,6)	1,4 (1,3-1,4)	83 (81,4-84,6)	97,6 (96,7-98,6)	1,2 (1,2-1,2)
Est immigrant	40,2 (39,2-41,1)	11,7 (8,8-14,6)	0,3 (0,2-0,4)	44,3 (43-45,6)	23,1 (16,3-29,9)	0,5 (0,4-0,7)	34,2 (32,3-36)	9,8 (5,4-14,2) ^E	0,3 (0,2-0,4)	17 (15,4-18,6)	2,4 (1,4-3,3) [£]	0,1 (0,1-0,2)
Sentiment d'appartenance à la communauté locale												
Faible /très faible	21,2 (20,4-22,0)	25,7 (22,7-28,8)	1,2 (1,1-1,3)	21,7 (20,6-22,8)	20,7 (14,6-26,9)	1,0 (0,7-1,2)	20,4 (18,9-22,0)	30,4 (25,3-35,4)	1,5 (1,3-1,6)	18,6 (16,8-20,4)	22,4 (18,4-26,4)	1,2 (1,1-1,3)
Fort / très fort	78,8 (78,0-79,6)	74,3 (71,2-77,3)	0,9 (0,9-1,0)	78,3 (77,2-79,4)	79,3 (73,1-85,4)	1,0 (0,9-1,1)	79,6 (78,0-81,1)	69,6 (64,6-74,7)	0,9 (0,8-0,9)	81,4 (79,6-83,2)	77,6 (73,6-81,6)	1,0 (0,9-1)

RC : Rapport de cotes (ratio Francophones/Anglophones)

Caractère gras : statistiquement significatif

[£] à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

^E Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycles combinés 2015-2020.

Comportements et habitudes de vie

	Ontario			Sud-Ouest			Est			Nord		
	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (95%IC)	% (95%IC)	RC (95%IC)
Activité physique de loisir												
Inactif	23,6 (22,8-24,4)	28,1 (24,7-31,6)	1,2 (1,1-1,3)	24,1 (23,1-25,1)	26,0 (20,2-31,8)	1,1 (0,9-1,3)	22,1 (20,6-23,6)	27,9 (22,7-33,2)	1,3 (1,1-1,4)	23,6 (22,0-25,3)	31,0 (26,6-35,3)	1,3 (1,2-1,4)
Modérément actif	13,9 (13,1-14,6)	16,8 (14,1-19,6)	1,2 (1,1-1,3)	14,0 (13,1-15,0)	18,4 (11,4-25,4) [£]	1,3 (0,9-1,7)	13,5 (12,3-14,7)	16,0 (12,4-19,7)	1,2 (1-1,3)	13,7 (12,0-15,3)	16,6 (13,4-19,8)	1,2 (1,1-1,3)
Actif	25,7 (24,8-26,5)	22,2 (18,8-25,5)	0,9 (0,8-1,0)	25,2 (24,1-26,3)	24,8 (18,5-31,0)	1,0 (0,8-1,2)	26,9 (25,4-28,5)	21,8 (16,5-27,1)	0,8 (0,6-1)	25,5 (23,8-27,1)	19,9 (15,9-24,0)	0,8 (0,7-0,9)
Tabagisme												
Non-fumeur	40,2 (39,2-41,1)	30,8 (27,4-34,3)	0,8 (0,7-0,8)	40,9 (39,7-42,1)	29,9 (22,9-36,8)	0,7 (0,6-0,9)	39,6 (37,8-41,4)	31,6 (26,4-36,8)	0,8 (0,7-0,9)	33,6 (31,6-35,6)	30,4 (25,6-35,2)	0,9 (0,8-1)
Ancien fumeur	39,6 (38,6-40,5)	48,0 (44,0-52,1)	1,2 (1,1-1,3)	38,8 (37,6-40,0)	47,6 (39,9-55,2)	1,2 (1,1-1,4)	40,8 (39,1-42,5)	47,2 (40,9-53,5)	1,2 (1-1,3)	43,8 (41,7-46,0)	50,2 (45,0-55,3)	1,1 (1,1-1,2)
Fumeur régulier et occasionnel	20,3 (19,5-21,1)	21,1 (18,0-24,2)	1,0 (0,9-1,1)	20,3 (19,3-21,3)	22,5 (16,3-28,8)	1,1 (0,8-1,4)	19,5 (18,0-21,1)	21,2 (16,6-25,8)	1,1 (0,9-1,2)	22,6 (20,7-24,4)	19,4 (15,5-23,3)	0,9 (0,7-1,0)
Consommation d'alcool												
Non buveur	30,3 (29,3-31,2)	27,3 (23,9-30,7)	0,9 (0,8-1,0)	30,6 (29,4-31,8)	32,0 (24,4-39,7)	1,0 (0,8-1,2)	29,8 (28,1-31,5)	21,9 (17,2-26,6)	0,7 (0,6-0,8)	27,9 (25,9-29,8)	32,5 (28,2-36,8)	1,2 (1,1-1,2)
Buveur occasionnel	17,2 (16,4-18,0)	19,3 (16,1-22,4)	1,1 (1,0-1,2)	17,3 (16,3-18,2)	15,7 (10,6-20,9) [£]	0,9 (0,7-1,1)	17,0 (15,4-18,6)	20,4 (14,9-25,8)	1,2 (1-1,4)	17,4 (15,6-19,2)	21,1 (17,9-24,4)	1,2 (1,1-1,3)
Buveur régulier	52,5 (51,5-53,6)	53,5 (49,3-57,6)	1,0 (1,0-1,1)	52,1 (50,8-53,4)	52,2 (44,3-60,2)	1,0 (0,9-1,1)	53,3 (51,4-55,1)	57,7 (51,1-64,2)	1,1 (1-1,2)	54,7 (52,4-57,1)	46,4 (41,9-50,8)	0,8 (0,8-0,9)
Consommation excessive d'alcool												
Jamais, moins d'une fois/mois	92,8 (92,4-93,3)	94,2 (92,5-95,8)	1,0 (1,0-1,0)	93,2 (92,6-93,8)	93,5 (90,5-96,5)	1,0 (1,0-1,0)	92,4 (91,6-93,3)	95,4 (93-97,8)	1,0 (1,0-1,0)	90,1 (89-9,01,3)	92,3 (88,6-95,9)	1,0 (1,0-1,0)
Une fois/mois ou +	7,2 (6,7-7,6)	5,8 (4,2-7,5)	0,8 (0,6-1,0)	6,8 (6,2-7,4)	6,5 (3,5-9,5) [£]	1,0 (0,6-1,3)	7,6 (6,7-8,4)	4,6 (2,2-7,0) [£]	0,6 (0,3-0,8)	9,9 (8,7-11,0)	7,7 (4,1-11,4) [£]	0,8 (0,5-1,0)

RC : Rapport de cotes (ratio Francophones/Anglophones)

Caractère gras : statistiquement significatif

[£] à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

[£] Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycles combinés 2015-2020.

Perception de la santé, problèmes de santé et limitations

	Ontario			Sud-Ouest			Est			Nord		
	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (95%IC)	% (95%IC)	RC (95%IC)
Stress perçu dans la vie												
Pas du tout	55,9 (54,9-56,9)	61,5 (58,2-64,7)	1,1 (1,1-1,1)	54,9 (53,6-56,2)	59,0 (51,8-66,1)	1,1 (1,0-1,2)	58,5 (56,7-60,4)	64,1 (59,1-69,1)	1,1 (1,0-1,1)	57,0 (55,0-59,1)	59 (54,2-63,7)	1,0 (1,0-1,1)
Un peu	31,6 (30,7-32,5)	25,9 (23,2-28,6)	0,8 (0,8-0,9)	32,1 (30,9-33,3)	26,5 (19,6-33,5)	0,8 (0,6-1,0)	30,2 (28,4-31,9)	24,3 (20,4-28,1)	0,8 (0,7-0,9)	31,5 (29,7-33,4)	28,5 (24,7-32,3)	0,9 (0,8-1)
Assez/ extrêmement	12,5 (11,9-13,1)	12,6 (10,3-14,9)	1,0 (0,9-1,1)	13,0 (12,2-13,8)	14,5 (9,9-19,1)	1,1 (0,8-1,4)	11,3 (10,3-12,3)	11,6 (8,1-15,2)	1,0 (0,8-1,2)	11,4 (10,1-12,8)	12,5 (9,1-15,9)	1,1 (0,9-1,2)
Santé perçue												
Mauvaise/ passable	19,6 (18,8-20,4)	19,1 (16,5-21,8)	1,0 (0,9-1,1)	19,8 (18,9-20,8)	16,8 (11,1-22,5) ^E	0,8 (0,6-1,1)	18,3 (16,9-19,7)	15,6 (11,7-19,5)	0,9 (0,7-1)	22,5 (20,7-24,3)	29,1 (25,1-33,1)	1,3 (1,2-1,4)
Bonne	31,7 (30,8-32,6)	33,9 (30,5-37,2)	1,1 (1,0-1,1)	32,5 (31,3-33,6)	33,9 (27,4-40,5)	1,0 (0,9-1,2)	29,3 (27,6-31)	35,3 (29,7-40,8)	1,2 (1,1-1,3)	32,7 (30,6-34,8)	31,0 (26,8-35,1)	0,9 (0,9-1)
Très bonne/ excellente	48,7 (47,7-49,7)	47 (43,3-50,7)	1,0 (0,9-1,1)	47,7 (46,4-48,9)	49,3 (41,9-56,6)	1,0 (0,9-1,2)	52,4 (50,6-54,2)	49,1 (43,4-54,9)	0,9 (0,9-1)	44,9 (42,7-47,0)	39,9 (35,1-44,7)	0,9 (0,8-1)
Santé mentale perçue												
Mauvaise/ passable	5,6 (5,2-6,1)	5,9 (4,0-7,7)	1,1 (0,8-1,3)	5,9 (5,4-6,5)	5,5 (1,1-10,0) ^F	0,9 (0,2-1,5)	4,9 (4,1-5,6)	4,6 (1,9-7,4) ^E	0,9 (0,5-1,3)	5,4 (4,3-6,4)	8,7 (6,0-11,3)	1,6 (1,4-1,8)
Bonne	23,2 (22,4-24,1)	21,2 (18,6-23,9)	0,9 (0,8-1,0)	23,4 (22,3-24,4)	15,6 (9,6-21,5) ^E	0,7 (0,4-0,9)	22,3 (20,8-23,9)	23,0 (19,0-26,9)	1,0 (0,9-1,1)	25,3 (23,4-27,3)	24,4 (20,0-28,8)	1,0 (0,9-1,1)
Très bonne/ excellente	71,1 (70,2-72,0)	72,9 (69,8-76,0)	1,0 (1,0-1,0)	70,7 (69,6-71,8)	78,9 (71,7-86,0)	1,1 (1,0-1,2)	72,8 (71,2-74,4)	72,4 (67,6-77,3)	1,0 (0,9-1,0)	69,3 (67,3-71,3)	66,9 (62,4-71,4)	1,0 (0,9-1,0)
IMC autodéclaré												
Normal (IMC < 25)	36,4 (35,4-37,4)	32,3 (28,6-36,0)	0,9 (0,8-1)	36,4 (35,1-37,7)	36,7 (28,5-44,8)	1,0 (0,8-1,2)	37,8 (35,8-39,7)	31,4 (25,8-37,0)	0,8 (0,7-0,9)	30,5 (28,2-32,7)	28,8 (23,5-34,0)	0,9 (0,8-1,0)
Embonpoint (IMC entre 25 et 30)	33,9 (33,0-34,9)	36,3 (32,0-40,5)	1,1 (1,0-1,2)	33,9 (32,7-35,1)	35,2 (26,5-44,0)	1,0 (0,8-1,3)	33,6 (31,7-35,5)	35,8 (28,9-42,6)	1,1 (0,9-1,2)	35,4 (33,0-37,7)	38,7 (33,9-43,5)	1,1 (1,0-1,2)
Obésité (IMC > 30)	29,7 (28,8-30,6)	31,4 (28,2-34,6)	1,1 (1,0-1,1)	29,7 (28,7-30,8)	28,1 (21,8-34,4)	0,9 (0,8-1,1)	28,6 (26,9-30,4)	32,8 (27,7-37,9)	1,1 (1,0-1,2)	34,1 (32,1-36,2)	32,5 (27,9-37,0)	1,0 (0,9-1,0)

Limitations d'activités dues à des douleurs *												
Aucune limitation	66,0 (64,5-67,6)	69,9 (64,3-75,4)	1,1 (1,0-1,1)	66,8 (64,9-68,7)	69,6 (59-80,3)	1,0 (0,9-1,2)	65,1 (62-68,2)	74,6 (65,9-83,4)	1,1 (1,1-1,2)	61,4 (57,7-65,1)	59,6 (52,6-66,6)	1,0 (0,9-1,0)
Limitation légère	20,4 (19,0-21,7)	19,4 (15,0-23,7)	1,0 (0,8-1,1)	20,0 (18,3-21,6)	16,0 (6,5-25,4) [£]	0,8 (0,4-1,2)	21,3 (18,6-24,0)	18,1 (11,8-24,4)	0,8 (0,6-1,0)	21,2 (18,4-24,1)	26,0 (18,9-33,1)	1,2 (1-1,4)
Limitation sévère	13,6 (12,5-14,7)	10,8 (6,8-14,8) [£]	0,8 (0,5-1,0)	13,3 (11,9-14,6)	14,4 (7,9-20,9) [£]	1,1 (0,7-1,4)	13,6 (11,6-15,6)	7,3 (0,8-13,7) [£]	0,5 (0,1-0,9)	17,4 (14,6-20,2)	14,4 (7,4-21,4) [£]	0,8 (0,5-1,1)
Santé dentaire (port d'une prothèse)												
Non	59,1 (57,3-60,9)	40,3 (33,1-47,6)	0,7 (0,6-0,8)	60,4 (58,1-62,7)	44,4 (30,9-58,0)	0,7 (0,5-0,9)	57,4 (53,9-60,9)	37,3 (27,0-47,6)	0,6 (0,5-0,8)	51,6 (48,1-55,0)	41,0 (31,9-50,0)	0,8 (0,7-0,9)
Oui	40,9 (39,1-42,7)	59,7 (52,4-66,9)	1,5 (1,3-1,6)	39,6 (37,3-41,9)	55,6 (42,0-69,1)	1,4 (1,1-1,6)	42,6 (39,1-46,1)	62,7 (52,4-73,0)	1,5 (1,3-1,6)	48,4 (45-51,9)	59,0 (50,0-68,1)	1,2 (1,1-1,3)
Maladies chroniques												
Nombre maladies (moyen)	2,2 (2,1-2,2)	2,2 (2,1-2,3)	1,0 (1,0-1,0)	2,2 (2,1-2,2)	2,0 (1,8-2,2)	0,9 (0,9-1,0)	2,2 (2,1-2,2)	2,2 (2,0-2,3)	1,0 (1,0-1,0)	2,3 (2,2-2,3)	2,6 (2,4-2,7)	1,1 (1,1-1,2)
0	16,3 (15,6-17,0)	14,7 (12,0-17,4)	0,9 (0,8-1,0)	16,5 (15,6-17,5)	13,4 (8,1-18,7) [£]	0,8 (0,5-1,1)	16,1 (14,8-17,4)	17,5 (12,8-22,2)	1,1 (0,9-1,3)	14,2 (12,7-15,7)	10,4 (7,4-13,4)	0,7 (0,6-0,9)
1	23,7 (22,9-24,6)	26,1 (23,2-29,0)	1,1 (1,0-1,2)	24,0 (22,9-25,1)	32,0 (24,7-39,4)	1,3 (1,1-1,6)	23,1 (21,6-24,7)	24,8 (21,2-28,4)	1,1 (1,0-1,1)	23,8 (21,9-25,8)	21,8 (18,0-25,5)	0,9 (0,8-1)
1 ou plus	83,7 (83,0-84,4)	85,3 (82,6-88,0)	1,0 (1,0-1,0)	83,5 (82,5-84,4)	86,6 (81,3-91,9)	1,0 (1,0-1,1)	83,9 (82,6-85,2)	82,5 (77,8-87,2)	1,0 (0,9-1,0)	85,8 (84,3-87,3)	89,6 (86,6-92,6)	1,0 (1-1,1)
2 ou plus	60,0 (59,0-60,9)	59,2 (55,6-62,8)	1,0 (0,9-1,0)	59,5 (58,3-60,7)	54,6 (47,0-62,2)	0,9 (0,8-1,0)	60,8 (59,1-62,5)	57,7 (51,9-63,5)	0,9 (0,9-1,0)	62,0 (59,9-64,1)	67,8 (63,6-72,0)	1,1 (1,1-1,1)

RC : Rapport de cotes (ratio Francophones/Anglophones)

Caractère gras : statistiquement significatif

[£] à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

[£] Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycles combinés 2015-2020.

Soins de santé et utilisation des services de santé

	Ontario			Sud-Ouest			Est			Nord		
	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An	Anglophones	Francophones	Ratio (RC) Fr/An
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)	RC (IC 95%)	% (95%IC)	% (95%IC)	RC (95%IC)
Fournisseur de soins de santé régulier												
Non	3,6 (3,3-4)	5,5 (3,2-7,8)	1,5 (1,0-2,0)	3,4 (3-3,8)	6,4 (1,5-11,3) ^F	1,9 (0,5-3)	3,6 (2,9-4,3)	5,2 (1,6-8,7) ^F	1,4 (0,6-2,0)	6,2 (4,9-7,6)	5,3 (2,8-7,7) ^E	0,9 (0,6-1,0)
Oui	96,4 (96-96,7)	94,5 (92,2-96,8)	1,0 (1,0-1,0)	96,6 (96,2-97)	93,6 (88,7-98,5)	1,0 (0,9-1,0)	96,4 (95,7-97,1)	94,8 (91,3-98,4)	1,0 (1,0-1,0)	93,8 (92,4-95,1)	94,7 (92,3-97,2)	1,0 (1,0-1,0)
Langue parlée avec fournisseur de soins de santé												
Anglais	96,2 (95,8-96,6)	59,0 (55,1-62,9)	0,6 (0,6-0,7)	95,7 (95,2-96,2)	93,2 (89,2-97,1)	1,0 (0,9-1,0)	96,9 (96,1-97,6)	43,2 (36,8-49,5)	0,4 (0,4-0,5)	98,5 (98,0-99,1)	30,4 (25,6-35,2)	0,5 (0,5-0,6)
Français	3,5 (3,1-3,9)	41,0 (37,1-44,9)	11,7 (11,5-12,0)	4,1 (3,6-4,7)	6,8 (2,8-10,7)	1,7 (0,8-2,3)	2,6 (1,8-3,3)	56,8 (50,4-63,1)	21,9 (19,1-28,0)	0,4 (0,2-0,7) ^E	47,7 (42,4-53,0)	119,3 (75,7-212,0)
Dernière consultation avec un professionnel de santé												
Moins de 3 mois	63,7 (62,0-65,5)	60,6 (53,9-67,4)	1,0 (0,9-1,0)	63,5 (61,3-65,7)	59,8 (45,7-74,0)	0,9 (0,7-1,1)	65,4 (62,2-68,6)	58,1 (47,2-69,0)	0,9 (0,8-1,0)	59,8 (56,1-63,5)	65,9 (55,8-76,0)	1,1 (1,0-1,2)
3 à 12 mois	26,3 (24,7-27,9)	28,5 (21,9-35,1)	1,1 (0,9-1,3)	26,6 (24,6-28,5)	30,2 (17,3-43,2) ^E	1,1 (0,7-1,5)	25,0 (22,1-27,9)	28,5 (17,6-39,3) ^E	1,1 (0,8-1,4)	29,0 (25,5-32,6)	26,8 (17,4-36,3)	0,9 (0,7-1,1)
Plus de 12 mois	10,0 (8,8-11,2)	10,9 (7,5-14,3)	1,1 (0,9-1,3)	10,0 (8,5-11,5)	9,9 (2,4-17,5) ^F	1,0 (0,3-1,5)	9,6 (7,1-12,1)	13,4 (7,8-19,0) ^E	1,4 (1,1-1,6)	11,2 (8,3-14,1)	7,3 (3,4-11,2) ^E	0,7 (0,4-0,8)
Consultation avec un professionnel de santé												
Santé mentale	7,8 (7,1-8,4)	7,6 (5,6-9,5)	1,0 (0,8-1,1)	7,9 (7,1-8,8)	7,9 (3,5-12,2) ^E	1 (0,5-1,4)	7,3 (6,1-8,5)	7,5 (4,7-10,3) ^E	0,9 (0,8-1,2)	7,9 (6,4-9,3)	7,4 (4,1-10,7) ^E	0,5 (0,6-1,2)
Consultation pour des soins dentaires												
Au moins une fois/an	73,5 (72,1-75,0)	63,0 (56,9-69,0)	0,9 (0,8-0,9)	74,0 (72,2-75,9)	64,2 (50,5-77,8)	0,9 (0,7-1,0)	74,2 (71,5-76,9)	66,7 (57,4-76,0)	0,9 (0,8-1,0)	65,0 (61,4-68,5)	53,4 (45,3-61,5)	0,8 (0,7-0,9)
Moins d'une fois/an ou en urgence	20,6 (19,2-21,9)	25,5 (19,9-31,2)	1,2 (1,0-1,4)	20,3 (18,6-22,1)	26,2 (13,0-39,4) ^E	1,3 (0,7-1,8)	20,1 (17,7-22,5)	22,9 (14,2-31,5) ^E	1,1 (0,8-1,4)	25,5 (22,4-28,6)	30,2 (23,0-37,5)	1,2 (1-1,3)
Jamais	5,9 (5,1-6,6)	11,5 (8,6-14,4)	1,9 (1,7-2,2)	5,6 (4,7-6,6)	9,6 (2,8-16,5) ^F	1,7 (0,6-2,5)	5,7 (4,4-7,1)	10,5 (7,2-13,7)	1,8 (1,6-1,9)	9,5 (7,5-11,6)	16,4 (10,3-22,4) ^E	1,7 (1,4-1,9)

Soins à domicile reçus	13,3 (12,4-14,2)	12,9 (10,4-15,4)	1,0 (0,8-1,1)	12,7 (11,5-14,0)	13,4 (8,1-18,6)	1,1 (0,7-1,3)	13,9 (12,5-15,4)	13,0 (9,1-17)	0,9 (0,7-1,1)	17,5 (15,6-19,4)	12,2 (9,2-15,3)	0,7 (0,6-0,8)
Type de soins à domicile reçus - 12 mois												
Soins infirmiers	5,4 (4,9-6,0)	6,1 (4,2-8)	1,1 (0,9-1,3)	5,0 (4,3-5,7)	5,6 (2,2-9,0) [£]	1,1 (0,5-1,6)	5,7 (4,7-6,8)	6,9 (3,6-10,2) [£]	1,2 (0,8-1,5)	9,2 (7,8-10,7)	5,0 (2,7-7,4)	0,5 (0,3-0,7)
Soins personnels / aide-ménagère	7,4 (6,6-8,1)	8,3 (6,2-10,5)	1,1 (0,9-1,3)	6,9 (5,9-8)	10,7 (5,8-15,7) [£]	1,6 (1,0-2,0)	8,1 (7-9,2)	7,3 (4,0-10,7) [£]	0,9 (0,6-1,2)	8,9 (7,4-10,4)	7,8 (5,7-9,8)	0,9 (0,8-0,9)
Besoins de santé non comblés	4,2 (3,8-4,6)	2,7 (1,5-3,9)	0,6 (0,4-0,8)	4,1 (3,7-4,6)	1,7 (0,2-3,2) [£]	0,4 (0,1-0,7)	4,6 (3,9-5,3)	3,0 (0,9-5,2) [£]	0,7 (0,2-1,0)	3,1 (2,0-4,2) [£]	3,2 (1,6-4,8) [£]	1 (0,8-1,1)
Vaccin contre la grippe saisonnière												
Moins d'un an	83,1 (82,3-84)	81,2 (77,8-84,6)	1,0 (0,9-1,0)	83,1 (82,1-84,1)	78,9 (70,6-87,1)	0,9 (0,9-1)	83,5 (82,0-85,1)	82,3 (77,8-86,7)	1,0 (0,9-1,0)	81,8 (79,7-83,8)	81,6 (77-86,3)	1,0 (1,0-1,0)
Moins de deux ans	5,2 (4,7-5,7)	4,8 (3,0-6,6) [£]	0,9 (0,6-1,2)	5,3 (4,6-5,9)	2,4 (0,2-4,7) [£]	0,5 (0,0-0,8)	5,1 (4,2-6,0)	5,2 (2,3-8,1) [£]	1,0 (0,5-1,4)	5,4 (4,1-6,6)	6,7 (4,0-9,3) [£]	1,2 (1,0-1,4)
Deux ans ou plus	11,6 (10,9-12,3)	14,0 (11,0-17,0)	1,2 (1,0-1,4)	11,6 (10,7-12,5)	18,7 (10,6-26,8) [£]	1,6 (1,0-2,1)	11,4 (10,1-12,7)	12,5 (8,9-16,2)	1,1 (0,9-1,3)	12,9 (11,1-14,6)	11,7 (7,6-15,8) [£]	0,9 (0,7-1,1)

RC : Rapport de cotes (ratio Francophones/Anglophones)

Caractère gras : statistiquement significatif

[£] à utiliser avec prudence (CV entre 16 et 33%)

[£] Estimation pas assez fiable pour publication (CV supérieur à 33%).

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycles combinés 2015-2020.